

Exámenes y vacunas para los niños y adolescentes

Las vacunas son muy importantes para mantener a tus hijos sanos. Aunque puede ser un poco difícil mantenerte al día con las vacunas de tus hijos, es muy importante estar actualizado para que ellos estén protegidos contra enfermedades graves.

Recuerda que todos los exámenes y las vacunas que se recomiendan pueden variar dependiendo donde vives, la salud de tu hijo, el historial médico de tu familia, el tipo de vacuna y su disponibilidad. Por eso es importante consultar con tu doctor sobre las vacunas y exámenes específicos para tu hijo. Algunas de las vacunas se pueden administrar como parte de una vacuna combinada para que tu hijo reciba menos inyecciones. A continuación se muestra una lista general de vacunas y exámenes recomendados que tu hijo puede necesitar durante la niñez y la adolescencia.

Recuerda: Todos los servicios recomendados de prevención están cubiertos por los planes del Mercado sin ningún costo adicional.

Se recomiendan los siguientes exámenes:

- Examen de audición para todos los recién nacidos
- Examen de autismo para los niños entre 18-24 meses
- Examen de la vista para todos los niños
- Examen para detectar la depresión en los adolescentes
- Evaluaciones sobre el comportamiento para los niños de las edades siguientes: 0 - 11 meses, 1 - 4 años, 5 - 10 años , 11 - 14 años , 15 - 17 años
- Mediciones de la altura, peso e índice de masa para los niños de las edades siguientes: 0 - 11 meses, 1 - 4 años, 5 - 10 años, 11 - 14 años, 15 - 17 años

Vacunas recomendadas por edad

Nacimiento

- VHB: vacuna contra la Hepatitis B (una segunda dosis se debe administrar uno o dos meses después de la primera vacuna)

2 meses

- DTaP: vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (pertussis)
- Hib: vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b
- VPI: vacuna contra el virus del polio inactivada
- PCV: vacuna contra la enfermedad neumocócica conjugada
- Rota: vacuna contra el rotavirus

4 meses

- DTaP: vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (pertussis)
- Hib: vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b
- VPI: vacuna contra el virus del polio inactivada
- PCV: vacuna contra la enfermedad neumocócica conjugada
- Rota: vacuna contra el rotavirus

6 meses

- DTaP: vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (pertussis)
- Hib: vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b
- VPI: vacuna contra el virus del polio inactivada
- PCV: vacuna contra la enfermedad neumocócica conjugada
- Rota: vacuna contra el rotavirus

6-18 meses

- Influenza: vacuna contra la gripe
- VHB: vacuna contra la Hepatitis B
- VPI: vacuna contra el virus del polio inactivada

12-15 meses

- Hib: vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b
- Triple vírica: vacuna contra el sarampión, las paperas, y la rubéola
- PCV: vacuna contra la enfermedad neumocócica conjugada
- Varicela: vacuna contra la varicela

12-23 meses

- Hep. A: vacuna contra la hepatitis A. Se recomienda aplicar dos inyecciones separadas por un intervalo mínimo de 6 meses

15-18 meses

- DTaP: vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina

4-6 años

- DTaP: vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina
- VPI: vacuna contra el virus del polio inactivada
- Triple vírica: vacuna contra el sarampión, las paperas, y la rubéola
- Varicela: vacuna contra la varicela

7-10 años

- Influenza: vacuna contra la gripe

11-12 años

- DTaP: vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina
- VPH: vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Se aplica en tres inyecciones durante 6 meses. Se recomienda tanto para niñas como para niños
- MCV: vacuna contra la meningitis
- Influenza: vacuna contra la gripe

13-18 años

- MCV: vacuna contra la meningitis (una dosis de refuerzo de recomienda a los 16 años)
- Influenza: vacuna contra la gripe